

Odinofagia por ectasia vascular

Odynophagia by vascular ectasia

Introducción

Paciente mujer fumadora de 56 años, sin antecedentes de interés, que refiere opresión faríngea y odinofagia sin disfagia al movilizar el cuello hacia la izquierda, progresiva desde hace un año, y últimamente disfonía.

A la exploración se aprecia un edema de Reinke, y al lateralizar el cuello hacia la izquierda nota cierta opresión faríngea. El tránsito esofágico baritado es normal, y la RM y angioTAC (Figs. 1, 2 y 3) muestra una dilatación de vena yugular interna izquierda.

Se remite a Cirugía vascular, donde el Eco- doppler realizado muestra la vena yugular izquierda dilatada a nivel cervical de 22 x 19 mm y aconseja observación con revisiones periódicas.

La ectasia de la vena yugular interna (VYI) es una rara anomalía venosa, descrita por Harris (1928) y Gerwing (1952) como quiste venoso, aneurisma venoso, venectasia, ectasia venosa, variz aneurismática y venoma, que consiste en una dilatación sáculo – fusiforme de VYI. También puede afectar a vena yugular externa, yugular anterior y comunicante superficial, aunque en orden decreciente en frecuencia. Suele ser idiopática y probablemente congénita, con varios factores predisponentes como irradiación del mediastino superior, trauma y defecto muscular congénito de la pared venosa. El segmento ectásico se atribuye a inflamación, trauma y cambios degenerativos. Suele precipitarse con la maniobra de Valsalva. Su diagnóstico diferencial suele realizarse con laringocele, divertículo y quiste branquial

El tratamiento depende de la clínica presentada y los efectos cosméticos sobre todo en mujeres, aunque se tiende a un tratamiento conservador, sobre todo en casos bilaterales.

Correspondencia

Dra. Elena Sánchez Legaza
Profesor Antonio Ramos, 9 - 4º C
San Fernando (Cádiz)
E-mail: manpro1910@hotmail.com




Figura 1




Figura 2



Figura 3